

## **Алгоритм недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в немедицинской организации**

В целях недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции необходимо обеспечить:

1. организацию при входе в помещение фильтра для сотрудников (посетителей):

- опрос о состоянии здоровья, о наличии респираторных симптомов ОРВИ (заложенность носа, насморк, кашель, боль в горле, одышка),

- измерение температуры тела бесконтактным термометром с фиксацией результатов в журнале учета (сотрудников, посетителей);

Если температура тела в норме и нет респираторных симптомов, то после проведения обработки рук антисептическим средством пропустить работника на рабочее место.

Если температура тела выше 37,0 С или есть наличие респираторных симптомов ОРВИ, то направить сотрудника домой с рекомендацией обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту проживания — вызвать медицинского работника на дом.

Сотрудник, выявивший лицо с респираторными симптомами, извещает руководителя организации (ответственное лицо) о выявленной ситуации.

В помещении проводится обработка дезинфицирующим раствором посредством разбрызгивания дезинфектанта с помощью пульверизатора.

2. обучение и инструктаж сотрудников по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID19, проведения противоэпидемических мероприятий, использованию СИЗ и мерам личной профилактики;

3. достаточное количество кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты;

4. соблюдение противоэпидемических мероприятий в организации (дезинфекция помещений, проветривание, обеззараживание предметов пользования, для обеззараживания воздуха применяются бактерицидный облучатель или другое устройство);

5. соблюдение масочного режима всеми сотрудниками организации в течении рабочего дня;

6. проведение термометрии всех сотрудников (утром и вечером) самостоятельно с фиксацией в журнале учета.

При контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией с профилактической целью рекомендуется:

- **рекомбинантный интерферон альфа (гриппферон)**, капли или спрей в каждый носовой ход 3 раза в день, 5 дней,

или **арбидол (умифеновир)** 200 мг 1 раз в день внутрь, 5 дней.

**Телефоны горячей линии Департамента здравоохранения Тюменской области: 8-800-250-30-91, 8 (3452) 68-45-65**

